

Bryophytes exotiques

par Pierre TIXIER *

Résumé. — In this paper, the second, the author gives a list of 86 species of Mosses and 46 species of Liverworts collected in Hawaii Islands, New Caledonia, New Hebrides archipelago, Southern India and Ceylon.

Nous donnons, dans cette seconde série ¹, une liste de Bryophytes concernant des récoltes faites dans différents territoires de l'océan Indien et de l'océan Pacifique.

Pour le Pacifique, nous fournissons, en premier lieu, l'identification d'une petite collection du Pr Roger HEIM, provenant de l'île d'Oahu, dans l'archipel des Hawaï. Les bryologues, surtout ceux du siècle dernier, ont appliqué aux Hawaï la notion d'endémisme stationnel (archipel isolé) avec trop de rigueur. En fait, beaucoup d'endémiques hawaïens correspondent à des espèces à vaste distribution dans les régions de l'océan Indien et du Pacifique.

La partie essentielle de cet article donne un troisième relevé des récoltes de Maurice SCHMID et de ses collaborateurs de l'ORSTOM en Nouvelle-Calédonie et aux Nouvelles-Hébrides. Rappelons que la dernière des Hébrides (qui n'est pas Anotom mais l'île Matthew) se trouve à la latitude de l'île des Pins. Nous indiquons la liste des récoltes de F. BLASCO, liste déjà donnée par ce dernier dans sa thèse sur la végétation montagnarde du sud de l'Inde.

Enfin, abordant un nouveau domaine, nous terminerons par l'énumération d'Épiphylls cinghalais, premières récoltes dans ce domaine du botaniste mauricien TIRVENGADUM. Ces récoltes montrent combien la flore de Lejeunéacées de l'antique Sri Lanka est proche de celle de Malaisie, au sens strict, et ce fait vient confirmer nos premières conclusions sur les distributions de certains sous-genres du genre *Cololejeunea* sous l'ensemble des tropiques.

I. HAWAÏ

Les récoltes de R. HEIM ont été faites dans la forêt primitive de l'île d'Oahu.

***Dicranella hochreutineri* Card.**

Endémique.

* Laboratoire de Cryptogamie, 12, rue de Buffon, 75005 Paris.

1. Première série, voir *Bull. Mus. natn. Hist. nat., Paris*, 3^e sér., n° 48, mai-juin 1972, Botanique 4 : 89-98.

Campylopus densifolius Angst.

Endémique très commun.

Leucobryum candidum (Brid.) Hook. f. & Wils. (= *L. gracile* Sull., *Bull. Torrey Bot. Club*, 1878, vol. sp. 12).

Espèce dont la distribution va de l'Himalaya à la Nouvelle-Zélande. Les synonymies sont à reprendre totalement.

Leucobryum pachyphyllum C. Muell.

Endémique.

Syrrhopodon hawaiiicus C. Muell.

Endémique, déjà connu d'Oahu.

Rhizogonium spiniforme (Hedw.) Bruch.

Pantropical.

Homaliodendron flabellatum (Smith) Fleisch.

Asie du sud-est et Pacifique.

Daltonia contorta C. Muell.

Java, Ceylan, Luzon, Malaisie.

Thuidium hawaiiense Reich.

Endémique connu de Oahu, probablement synonyme de *T. cymbifolium* Doz. & Molk., distribuée des Indes à la Mélanésie.

II. NOUVELLE-CALÉDONIE

MOUSSES

Dicranoloma deplanchei (Duby) Par.

Mont Paeoua, sommet ouest, forêt humide, sur roche, 1 000-1 140 m, 9-VII-1970 (McKee n° 22259).

Dicranoloma platyloma (Besch.) Par.

Mé Maoya, mousse épiphyte sur tronc en forêt humide, 1 450 m, 6-V-1971 (McKee n° 23691); Roche Ouainème, 650 m, VI-1971 (McKee s. n.).

Campylopus balanseanus Besch.

Prony, Rivière Bleue, au sol en forêt, 300 m, IX-1964 (Schmid s. n.); mont des Sources, au sol, 800 m, VII-1971 (Schmid n° 243).

Campylopus rugosus Besch.

Grand Lac sud, au sol, 29-IX-1904, Musée Colonial de Nouméa (Cribs n° 1614).

Leucobryum bowringii Mitt.

Pouébo, rupicole dans le lit d'un ruisseau, 26-V-1971 (McKee n° 23740) ; Roche Ouainème sur bois en forêt, 600 m, VI-1971 (Schmid n° 203) ; Negropo, épiphyte sur tronc au sol en forêt humide, 500-600 m, 26-VI-1971 (McKee n° 23884).

Synodontia connivens (Besch.) Broth.

(McKee n° 18272).

Synodontia pancheri (Besch.) Broth. var. **sericeus** (Besch.) Broth.

Plateau de Kouaoua, épiphyte sur tronc de *Araucaria montana*, 700 m (s. d., s. n., leg. T. Jaffré).

Eucamptodon ciliatus (Besch.) Broth.

Mont Paeoua, sommet ouest, 1 000-1 140 m, 9-VII-1970 (McKee n° 22258).

Bryum coronatum Schwaegr.

Nouméa, fissure de murs humides, 9-VII-1971 (McKee n° 23296).

Rhizogonium novae-caledoniae Besch.

Negropo, épiphyte sur tronc en forêt humide, 500-700 m, 28-VI-1971 (McKee n° 23885) ;
Pouébo, rupicole dans le lit d'un ruisseau, 26-V-1971 (McKee n° 23741).

Goniobryum subbasilare (Hook.) Lindb.

(McKee n° 18272).

Genre nouveau pour la Nouvelle-Calédonie, avec la distribution : Tasmanie, île Nord de la Nouvelle-Zélande, Australie, Terre de Feu.

Hypnodendron menziesii (Hook.) Par. var. **splendidum** (Broth.) Touw.

Pouébo, mousse rupicole dans le lit d'un ruisseau, 26-V-1971 (McKee n° 23742).

Macromitrium villosum (Besch.) Broth.

Mé Ori, plateau sommital, forêt humide, 900-1 000 m, 3-XII-1969 (McKee n° 21206) ;

Mé Maoya, forêt humide, 1 450 m, 6-V-1971 (McKee).

Espèce peut-être synonyme de *M. reinwardtii*.

Macromitrium pulchrum Besch. var. **aristatum** Thér.

Mont Do, pente ouest, forêt humide, 800 m, 28-X-1969 (McKee n° 21118).

Racopilum cuspidigerum (Schwaegr.) Mitt. var. **demissum** Lac.

Ile des Pins, épiphyte à la base des troncs, plateau central, 1-VI-1971 (McKee n° 23524).

Racopilum spectabile Reinw. & Hornsch.

Massif du Ninga, Pic nord-est vers 1 200 m, épiphyte à la base d'un tronc, sur *Cyathea*, 7-VI-1972 (Veillon n° 2668).

Ptychomnion aciculare Brid.

Table Unio, versant sud, rupicole en zone humide, 900 m, 12-XI-1970 (McKee n° 22890).

Calyptothecium philippinense Broth. (= *C. bernierii* Broth.).

Hauteurs de Nessadine, forêt vers 450 m, 30-VII-1969 (Schmid s. n.).

Camptochaete porotrichoides (Besch.) Broth.

Hauteurs de Nessadine, vers 300 m (Schmid s. n.).

Rhynchostegiella menadensis (Bosch & Lac.) Bart.

Néhoué, sud du Pic Ougre, rupicole au-dessus d'un ruisseau, 50 m, 28-V-1971 (McKee n° 23809).

Espèce nouvelle pour la Nouvelle-Calédonie.

Sematophyllum elaschistos (Duby) Thér.

Ile des Pins, corticole à la base d'un tronc, plateau central, 1-IV-1971 (McKee n° 23524).

Ectropothecium cupressinatum (C. Muell.) Jaeg.

Prony, Rivière Bleue, rupicole, 250 m, X-1969 (Schmid s. n.).

Ectropothecium nitidum Thér.

Negropo, sur bois, au sol, en forêt humide, 500-700 m, 28-VI-1971 (McKee n° 23884).

HÉPATIQUES

Schistochila aligera (Nees & Blume) St.

Prony, Rivière Bleue, rupicole en forêt, 300 m, 28-IX-1967 (SCB n° 100) ; mont Mou, forêt humide, sur sol et tronc, 1 150 m, 19-II-1939 (Virost n° 17).

Schistochila philippinensis (Mont.) Jack & St.

Mont Mou, en forêt, au sol, 1 150 m, 19-II-1939 (Virost n° 6).

Espèce nouvelle pour la Nouvelle-Calédonie.

Bazzania limbata (St.) P. Tx. nov. comb. (= *Mastigobryum limbatum* St. *Sp. Hep.*, 1924, t. VI, p. 472).

Quinné, vers 1 000 m, 6-XII-1964 (Schmid, n° CR 8) ; Prony, plateau nord vers 300 m, X-1903 (L. Cribbs n° 1624).

Connu des monts Koghis.

Bazzania deplanchei (St.) P. Tx. nov. comb. (= *Mastigobryum deplanchei* (G. ms) St. *Sp. Hep.*, 1908, t. III, p. 505).

Quinné, sous forêt, corticole, 900 m, 6-XII-1964 (Schmid n° 10).

Connu du mont Mi.

Radula formosa (Meissner) Nees

Mont Mou, forêt humide supérieure, 1 000 m, 10-IX-1938 (Virost n° 23).

De Java à Tahiti, connu des monts Koghis.

Cololejeunea mouensis nov. sp.

Mont Mou, forêt humide supérieure, 1 000 m, 10-IX-1958 (Virost n. s.).

Espèce du sous-genre *Cryptolejeunea*.

Leptolejeunea epiphylla (Mitt.) St.

Iles Loyauté, Lifou, région de Vé, épiphyllé en falaise, IX-1971 (Schmid n° 244).

Frullania deplanchei St.

Prony, Sébertville, sur hématite au niveau de la mer, XII-1903 (L. Cribbs n° 1475) .

III. NOUVELLES-HÉBRIDES

MOUSSES

Ceratodon purpureus (L.) Brid.

Tanna, mont Toukosmereu, vers 400 m, sur sol découvert, VIII-1971 (Schmid n° 221).

Leucoloma subtenuifolium Broth. & Watts

Anotom, centre sud-est, corticole, en forêt, vers 500 m, 23-VIII-1971 (Schmid n° 225).

Leucobryum bowringii Mitt.

Anotom, Ouganaerck, Mousses fructifiées en forêt basse de crête, 16-V-1971 (Schmid n° 201).

Arthrocormus schimperii Doz. & Molk.

Anotom, base de tronc, vers 550 m, 20-VII-1971 (Schmid n° 224).

Syrrhopodon tristichus Nees

Tanna, Toukosmereu, en forêt de crête, 1 080 m, 26-XII-1971 (Schmid n° 216).

Thyridium fasciculatum (Hook. & Grev.) Fleisch.

Anotom (Schmid n° 230).

Calymperes chamaeleonteum C. Muell.

Anotom, Inrero (sud-ouest), tronc couché, en forêt, 17-V-1971 (Schmid n° 198).

Hydrogonium comosum (Doz. & Molk.) Hilp.

Espiritu Santo, berge de l'Apouna, rupicole sur calcaires, 27-VIII-1971 (Veillon n° 2324).

Rhizogonium setosum (Mitt.) Mitt.

Tanna, Toukosmereu, base de tronc, forêt de crête, 900-1 000 m, 28-VII-1971 (Schmid n°s 217, 218) ; Anotom, sur tronc dans une clairière, 17-V-1971 (Schmid, n° 202) ; *idem*, épiphyte, 500-600 m, 17-V-1971 (Schmid n° 209) ; *idem*., forêt sublittorale, sur bois mort, 22-VII-1971 (Schmid n° 223).

Rhizogonium spiniforme (L.) Bruch

Espiritu Santo, crête nord du Tabewasana, vers 1 800 m, terrestre, sur litière, formation sommitale à *Vaccinium*, 4-IX-1971 (Veillon n° 2333).

Hypnodendron vitiense Mitt. spp. *vitiense*

Espiritu Santo, crête nord du Tabewasana, vers 1 500 m, terrestre, sur litière en forêt humide à *Metrosideros villosa*, sur andésites, 4-IX-1971 (Veillon n° 2332).

Spiridens flagellosus Schimp.

Espiritu Santo, crête nord du Tabewasana, vers 1 300 m, épixyle sur *Dicksonia*, forêt à *Metrosideros villosa*, 4-IX-1971 (Veillon n° 2327) ; Anotom, sur tronc en forêt, Ouganaerck, 500 m, 16-V-1971 (Schmid n° 199) ; sur tronc, en forêt à Mousses, 600 m, 23-VII-1971 (Schmid n° 208).

Macromitrium reinwardtii Schwaegr.

Anotom, Inrero (sud-ouest), tronc couché, en forêt, vers 350 m, 17-V-1971 (Schmid n° 198).

Macromitrium salakanum C. Muell.

Nouvelles-Hébrides.

Macromitrium sulcatum (Hook.) Brid.

Anotom, centre sud, corticole, en forêt néphéliphile, 23-VII-1971 (Schmid n° 228).

Euptychium gunnii Broth. & Watts

Anotom, centre sud-est, corticole, vers 500 m, 23-VII-1971 (Schmid n° 225).

Symphysodon vitianus (Sull.) Broth.

Anotom, Inrero, vers 400-500 m, 17-V-1971 (Schmid n° 194).

Meteorium miquelianum (C. Muell.) Fleisch.

Tanna, forêt néphéliphile, 28-VII-1971 (Schmid n° 236).

Aerobryopsis longissima (Doz. & Molk.) Fleisch.

Tanna, mont Toukosmereu, vers 1 000 m (Schmid n° 241).

Floribundaria floribunda (Doz. & Molk.) Fleisch.

Iles Banks (s. d., s. n.).

Espiritu Santo, Malao, sur tronc en forêt sublittorale, 27-VII-1971 (Veillon n° 2320).

Efatu, propriété Gaillanche, vers 80 m, base de tronc, 15-VII-1971 (Schmid n° 220).

Anotom, Mousse en draperie au-dessus du ruisseau, en forêt, 80 m, 23-VII-1971 (Schmid n° 222).

Neckeropsis lepineana (Mont.) Fleisch.

Anotom, Inrero, corticole, vers 400-500 m, 17-V-1971 (Schmid n° 194).

Homaliodendron flabellatum (Smith.) Fleisch.

Nouvelles-Hébrides.

Homaliodendron microdendron (Mont.) Fleisch.

Espiritu Santo, arrière de Malao, épiphyte sur troncs, en forêt secondaire, 27-VIII-1971 (Veillon n° 2331).

Camptochaete porotrichoides (Besch.) Broth.

Anotom, Inrero, vers 400-500 m, 17-V-1971 (Schmid n° 194 bis).

Chaetomitrium torquescens Bosch. & Lac.

Nouvelles-Hébrides, forêt à Mousses, 600 m, 20-VII-1971 (Schmid n° 232).

Thuidium glaucinum (Mitt.) Jaeg.

Espiritu Santo, arrière de Malao, épiphyte sur tronc, forêt secondaire humide, 27-VIII-1971 (Veillon n° 2321).

Anotom, Inrero, 400 m, rupicole, en forêt, V-1971 (Schmid n° 197).

Thuidium meyenianum (Hpe) Doz. & Molk.

Espiritu Santo, arrière de Malao, en association avec l'espèce suivante ; sur tronc, en forêt secondaire, 27-VIII-1971 (Schmid n° 2322).

Pelekium velatum Mitt.

Idem (Schmid n° 2323).

Trismegistia complanatula (C. Muell.) C. Muell.

Anotom (Schmid n°s 210, 239).

Acroporium turgidum (Doz. & Molk.) Fleisch.

Tanna, Toukosmereu, entre 10 et 1 000 m, 23-VII-1971 (Schmid n°s 212, 235, 238).

Trichosteleum hamatum (Doz. & Molk.) Jaeg. var. **semimamillosus** (C. Muell.) Gard.

Tanna, mont Toukosmereu, forêt, vers 1 000 m, 28-VII-1971 (Schmid n° 219).

Anotom, ouest de Ouganaerck, en forêt dense de côte (Schmid n° 201).

Ectropothecium aubertii Thér.

Tanna, mont Toukosmereu, corticole, en forêt, 900-1 000 m, 28-VII-1971 (Schmid n° 213).

Isopterygium pohliaecarpum (Sull. & Lesq.) Jaeg.

Espiritu Santo, berges de l'Apouna, Mousses plus ou moins immergées sur rochers calcaires, 30-VIII-1971 (Veillon n° 2325).

Pogonatum circinatum Besch.

Espiritu Santo, crête nord du Tabewasana, vers 1 500 m, terrestre ou rupicole en forêt humide à *Metrosideros villosa*, sur andésites, 4-IX-1971 (Veillon n° 2331).

HÉPATIQUES

Marchantia cf. **lamellosa** Hpe

Espiritu Santo, berges de l'Apouna, vers 150 m, rupicole sur calcaires, 27-VIII-1971 (Veillon n° 2324).

Plagiochila sp.

Espiritu Santo, crête nord du Tabewasana, vers 1 300 m, forêt à *Metrosideros villosa*, 4-IX-1971 (Schmid n°s 2328, 2330).

Tanna-Anotom, juillet 1971 (Schmid n° 227).

Bazzania cf. **aneityense** (St.) P. Tx. nov. comb. (*Mastigobryum aneityense* St., *Sp. Hep.*, 1924, t. VI, p. 452).

Anotom, vers 600 m, associé à *Spiridens flagellosus*, 23-VII-1971 (Schmid n° 208).

Bazzania serrifolium (St.) P. Tx. nov. comb. (*Mastigobryum serrifolium* St., *Sp. Hep.*, 1908, t. III, p. 484)

Anotom, centre sud, forêt néphéliphile, 600 m (Schmid n^{os} 229, 240).

Bazzania spiralis (Reinw., Blume, Nees) Meijer

Anotom, centre sud, forêt néphéliphile, 600 m (Schmid n^{os} 229, 240).

Lepidozia trichodes (Reinw., Blume, Nees) Nees

Espiritu Santo, pente nord du Tabewasana, vers 1 500 m, corticole en forêt primaire à *Metrosideros villosa*, 4-IX-1971 (Veillon n^o 2329).

Tanna, mont Toukosmereu, 900-1 000 m, en forêt, 28-VII-1971 (Schmid n^{os} 215, 236).
Anotom VII-1971 (Schmid n^o 207).

Schistochila acuminata St.

Tanna, mont Toukosmereu, corticole en forêt de crête, vers 1 050 m, 28-VII-1971 (Schmid n^o 214).

Correspond bien à la plante de Mindanao.

Chandonanthus hirtellus (Web.) St.

Espiritu Santo, crête nord du Tabewasana, vers 1 300 m, corticole en forêt à *Metrosideros villosa*, 4-IX-1971 (Veillon n^o 2328).

Mastigophora diclados Endl.

Anotom, centre sud, forêt néphéliphile, 600 m, 25-VII-1971 (Schmid n^{os} 227, 229).

Sud de l'archipel (Schmid n^o 240).

Trichocolea pluma Mont.

Anotom, forêt de crête, 550 m, VII-1971 (Schmid n^{os} 209-226).

Trichocolea cf. **tamina** St.

Anotom, Inrero, forêt clairière, au sol, 17-V-1971 (Schmid n^o 196).

Cololejeunea aff. **filicaulis** St.

Anotom, 600 m, sur rameaux de *Guettarda*, 23-VII-1971 (Schmid s. n.).

Espèce allant de l'Afrique (Cameroun) à la Mélanésie, avec des degrés de vicariance relativement faibles.

Drepanolejeunea cf. **yulensis** St.

Anotom (s. d., s. n.).

Lejeunea albescens (St.) Miz.

Anotom, Inrero, sur tronc, en forêt, 17-V-1971 (Schmid n^o 198).

Leptolejeunea vitrea (Nees) St.

Anotom, 600 m, épiphyllé sur *Lycopodium* (Schmid n° 211).

Microlejeunea cucullata (Nees) St.

Anotom, 600 m, sur rameaux de *Guettarda*, 23-VII-1971 (Schmid s. n.).

Pycnolejeunea anotomea nov. sp.

Anotom, en mélange avec l'espèce précédente.

Ptychantus striatus (Lehm. & Lindenb.) Nees

Espiritu Santo, nord-ouest de Cotamtam, base de tronc, en forêt secondaire humide, au sol, vers 600 m, 3-IX-1971 (Veillon n° 2336).

Taxilejeunea patersonii (St.) Eifrig

Sud de l'archipel (Schmid n° 240).

Frullania apiculata Auct.

Anotom, 600 m, sur rameaux de *Guettarda*, 23-VII-1971 (Schmid s. n.).

Frullania intermedia (Reinw., Blume, Nees) Dum.

Tanna, mont Toukosmereu, forêt néphéliphile, 23-VII-1971 (Schmid n° 235).

Anotom, forêt à Mousses, 600 m, 20-VII-1971 (Schmid n° 232).

Frullania regularis Schiffn.

Anotom, sud-ouest, 350-400 m, 17-V-1971 (Schmid n° 200).

Frullania ternatensis Gott.

Anotom, centre sud, corticole, en forêt néphéliphile, 23-VII-1971 (Schmid n° 228).

IV. SUD DE L'INDE (PALNI HILLS)

MOUSSES

Récoltes de F. BLASCO (Institut Français de Pondichéry).

Wilsoniella pellucida (Wils.) C. Muell.

Palni, versant nord, sur sol forestier, 1 900 m, 20-I-1969 (n° 1740).

Brachymenium nepalense Hook.

Poombarai Forest Bungalow, sur *Acacia*, 1 950 m, 19-I-1969 (n° 1742).

Rhodobryum giganteum (Hook.) Par.

En forêt, 2 100 m, 26-VIII-1967 (n° 287).

Webera scabridens (Mitt.) Jaeg. (= *W. humicola* Dix. & Varde, *Arch. Bot.*, 1927, 1 (8-9), 169, 2)

Parikombai, rochers ensoleillés et humides, 1 900 m, 20-I-1969 (n° 1744).

Mnium rostratum Schr.

Roir Point, forêt ripicole, 28-VIII-1967 (n° 1748) ; Kukkal, épiphyte, en forêt, 1 950 m, 19-I-1969 (n° 1745).

Rhizogonium spiniforme (L.) Bruch.

Bear Shola, au sol, 2 150 m, 20-V-1969 (n° 1739) ; épiphyte, en station ripicole, 1 700 m, 10-V-1967 (n° 1746).

Trachypus bicolor Reinw. & Hornsch.

En forêt, sur bois au sol, 2 100 m, V-1969 (n° 1747).

Barbella determesii (Ren. & Card.) Fleisch.

Roir Point, forêt ripicole, 28-I-1969 (n° 1748) ; Kukkal, en forêt, 2 100 m, 18-VI-1969 (n° 1757).

Thuidium glaucinum (Mitt.) Jaeg.

Kukkal, épiphyte en forêt, 1 950 m, 19-I-1969 (n° 1745) ; épiphyte, en station ripicole, 1 700 m, 10-V-1967 (n° 1746).

Campylodontium flavescens (Hook.) Bosch & Lac.

Roir Point, forêt ripicole, 28-VIII-1967 (n° 1748) ; en forêt, sur bois au sol, 2 100 m, V-1969 (n° 1747).

Erythrodontium julaceum (Hook.) Par.

Palni, versant est, rochers en forêt claire, 1 200 m, 21-I-1969 (n° 1741).

Eurynchium vagans (Harv.) Bart.

Palni Hills, en forêt, sur bois au sol, 2 100 m, V-1969 (n° 1747).

Pogonatum teysmannianum (Doz. & Molk.) Bosch & Lac.

Palni Hills, près de Lac Berijan, sur rochers, 2 200 m, 15-V-1969 (n° 1738).

V. SRI LANKA

Toutes les récoltes cinghalaises que nous avons examinées ne portent pas d'indication de localité.

MOUSSES

Braunfelsia scariosa (Wils.) Par.
Blasco (n° 1765).

Rhizogonium spiniforme (Hedw.) Bruch.
Blasco s. n.

Groutiella goniorrhyncha (Doz. & Molk.) Wijk & Marg.
Blasco (nos 1758, 1761, 1763, 1766).

Racopilum schmidii (C. Muell.) Mitt.
Épiphyte (Tirvengadum s. n.).

Aerobryopsis longissima (Mont.) Fleisch.
Épiphyllé (Tirvengadum s. n.).

Meteriopsis squarrosa (Hook.) Fleisch.
Épiphyllé (Tirvengadum s. n.).

Homaliodendron exiguum (Bosch & Lac.) Fleisch.
Épixyle (Tirvengadum s. n.).

Isopterygium pohliaecarpum (Sull. & Lesq.) Mitt.
Blasco (n° 1760).

Atrichum aculeatum Card. & Varde
Épixyle Tirvengadum, endémique de la dition.

HÉPATIQUES

Cette liste ne concerne que des espèces épiphyllées dues aux récoltes de M. TIRVENGADUM. Nos renseignements sur les Lejeunéacées cinghalaises étant relativement peu importants et anciens, nous donnons les distributions et indiquons les espèces nouvelles pour le Sri Lanka *.

Radula acuminata St.

De Ceylan à la Malaisie occidentale.

***Cololejeunea falcatoides** Bx.

Sumatra, Java, Bornéo, Thaïlande, Cambodge, Célèbes, Luzon.

***Cololejeunea gynophthalma** Bx.

De Ceylan à la Nouvelle-Calédonie. Espèce pantropicale si on joint à cette distribution celle de son espèce-jumelle *C. appressa*.

Cololejeunea aff. **lanciloba** St.***Cololejeunea pseudofloccosa** (Hor.) Bx.

Japon, Chine, Vietnam, Cambodge, Java.

***Cololejeunea triapiculata** (Herz.) P. Tx.

Malaisie, Java, Sumatra.

Colura acroloba (Mont.) S. J. A.

De Ceylan à la Nouvelle-Calédonie.

Hygrolejeunea discreta (Ldbg.) St.

Ceylan, Sumatra, Java, Moluques.

Leptolejeunea epiphylla (Mitt.) St.

De Ceylan à la Nouvelle-Calédonie et Tahiti.

***Leptolejeunea vitrea** (Nees) St.

Malaisie, Chittagong, Sumatra, Java, Bornéo, Philippines, Moluques, Cambodge, Nouvelles-Hébrides.

Lopholejeunea subfusca (Nees) St.

Asie et Océanie tropicales.

***Harpalejeunea indica** St.

Sud de l'Inde.

***Taxilejeunea dipterota** Eifrig

Malabar, Sumatra, Java.

Frullania moniliata (Reinw., Blume, Nees) Mont., spp. **obscura** Verd.

Sud de l'Inde, Ceylan, Chine, Japon, Philippines, sud Indochinois.

Manuscrit déposé le 4 mai 1973.

*Bull. Mus. natn. Hist. nat., Paris, 3^e sér., n° 190, sept.-oct. 1973,
Botanique 10 : 73-86.*

Achévé d'imprimer le 30 avril 1974.